

## БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

	<b>Способы борьбы с борщевиком Сосновского</b>	
	<b>Механический и агротехнический</b>	<b>Химический</b>
<b>Сельскохозяйственные земли</b>	Многократное скашивание для предотвращения цветения и созревания семян Вспашка и дискование для полного уничтожения вегетирующих растений борщевика	Наименование используемых гербицидов, нормы применения, время обработки и кратность - в зависимости от предшественника, выращиваемой и последующей культур
<b>Полосы отвода отчуждения железных и автомобильных дорог, охранные зоны ЛЭП, промышленные территории</b>	Многократное скашивание и срезание бульдозерами вегетативной массы борщевика до периода цветения	Сплошные (уничтожающие все виды растений) гербициды почвенного и системного действия
<b>Населенные пункты</b>	Многократное скашивание для предотвращения цветения и созревания семян	Гербициды, разрешенные к применению на территории населенных пунктов
<b>Территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, в непосредственной близости от воздухозаборных устройств</b>	Многократное скашивание или выкапывание	Не допускается применение любых пестицидов (СанПиН 1.2.2584-10)
<b>Сроки проведения</b>	До периода цветения Повторные обработки не менее 2-3 раза за сезон для предотвращения цветения и созревания семян	В зависимости от вида применяемого гербицида Первое опрыскивание следует проводить ранней весной при отрастании борщевика Сосновского до 15-20 см Вторую обработку рекомендуется провести после появления всходов борщевика в период с 15 августа до 15 сентября Обязательно соблюдение регламента применения пестицидов и рекомендаций производителей пестицидов!